

O Fortalecimento do Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama na Atenção Primária



Saúde da Família


VII Encontro Nacional para o Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama

A importância da Atenção Primária em Saúde

Em todo o mundo já é consenso que os sistemas nacionais de saúde devem ser baseados na APS

A APS deve ser coordenadora de uma resposta ampla em todos os níveis de atenção.

Situação de Implantação de Equipes de Saúde da Família, Saúde Bucal e Agentes Comunitários de Saúde - Brasil, MARÇO/2011



Nº ESF – 31.974
Nº MUNICÍPIOS -


Nº ACS – 246.076
Nº MUNICÍPIOS -

Nº ESB – 20.593
Nº MUNICÍPIOS – 4.825




FONTE: SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica
SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de estabelecimentos em Saúde

Meta e Evolução do Número de Equipes de Saúde da Família Implantadas




FONTE: SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica
SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de estabelecimentos em Saúde

Evolução da Cobertura Populacional (%) de ACS e ESF-BRASIL - 2001 - MARÇO/2011








FONTE: SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica
 SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de estabelecimentos em Saúde

Cobertura da Estratégia Saúde da Família Março de 2011



Cobertura:

-  Menor igual a 20%
-  Entre 20,1% e 40%
-  Entre 40,1% e 60%
-  Entre 60,1% e 80%
-  Maior que 80%

Monitoramento das ações de prevenção do câncer de colo de útero na Atenção Básica

Razão entre exames citopatológicos na faixa etária de 25 a 59 anos definidas segundo estratos de cobertura do PSF*. Brasil, 2006 - 2009


	Estratos de cobertura do PSF				Brasil
	< 20%	20 --- 50%	50 ---70%	>= 70%	
2006	0.14	0.15	0.18	0.22	0.17
2007	0.13	0.15	0.18	0.21	0.17
2008	0.13	0.16	0.18	0.21	0.17
2009	0.12	0.15	0.17	0.20	0.16

FONTE: Siscolo e IBGE

SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de estabelecimentos em Saúde

* cobertura de dezembro de 2009

Razão entre exames citopatológicos na faixa etária de 25 a 59 anos definidas segundo estratos de cobertura do PSF*- Brasil, 2006 - 2009




FONTE: Siscolo e IBGE

SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de estabelecimentos em Saúde

* cobertura de dezembro de 2009


Pesquisa Amostral 2008

Proporção de Equipes de Saúde da Família que dispõem de mesa ginecológica em sua Unidade de Saúde




Pesquisa Amostral 2008

Proporção de Equipes de Saúde da Família que dispõem de espéculos ginecológicos em sua Unidade de Saúde




Pesquisa Amostral 2008

Proporção de Equipes de Saúde da Família que realizaram coleta de material para prevenção do câncer de colo do útero




Pesquisa Amostral 2008

Proporção de Equipes de Saúde da Família em que os médicos realizaram atendimento clínico em ginecologia




Pesquisa Amostral 2008

Proporção de Equipes de Saúde da Família em que os enfermeiros realizaram atendimento clínico em ginecologia




Pesquisa Amostral 2008

Proporção de Equipes de Saúde da Família em que os médicos foram submetidos a capacitação / atualização em Saúde da Mulher



Pesquisa Amostral 2008

Proporção de Equipes de Saúde da Família em que os enfermeiros foram submetidos a capacitação / atualização em Saúde da Mulher



Dificuldades

- Seguimento das mulheres
- Busca – ativa das mulheres com lesões precursoras
- Problemas na infra-estrutura das unidades
- Dificuldades de acesso - distâncias
- Falta de capacitação das equipes
- Coleta pela enfermeira/ato médico
- Falta de planejamento local
- Rotinas e programa de rastreamento
- Falta de sensibilidade dos profissionais para o problema e do seu papel na coleta

Proposta da Atenção Básica no Processo de Monitoramento das ações de prevenção do câncer de colo de útero e da mama

- Ampliar/Expandir a Cobertura das Equipes de Saúde da Família dirigida às Áreas do Mapa da Pobreza
- **Estruturar a Rede de Atenção Primária**
Financiamento de UBS com estrutura física adequada para atendimento ginecológico (planta com consultório ginecológico)

Proposta da Atenção Básica no Processo de Monitoramento das ações de prevenção do câncer de colo de útero e da mama

- **Qualificar a oferta dos exames citopatológico**

Disponibilizar EAD (Definir conteúdo, parcerias, público, outros)

- Elaboração e distribuição de um vídeo sobre Câncer de Útero e Câncer de Mama (para capacitar os profissionais na coleta).

- Revisar, publicar e distribuir 35.000 exemplares do Caderno de Atenção Básica nº 13 (controle dos canceres do colo do útero e da mama)

- Distribuir 32.000 exemplares do CAP 29 (rastreamento)

Nova Política Nacional de Atenção Primária

- **Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da APS**

Avaliação por desempenho: indicadores

Razão entre exames citopatológicos do colo do útero na faixa etária de 25 a 59 anos e a população alvo

Percentual de seguimento/tratamento informado de mulheres com diagnóstico de lesões intraepiteliais de alto grau do colo do útero

- Monitoramento de indicadores
- Avaliação externa (avaliação in loco das ações de saúde da mulher);
- Municípios que equipes aderirem ao PMAQ:
 - oferecer apoio institucional
 - plano de educação continuada.

O grande desafio de fazer SAÚDE com ampliação do acesso e mais qualidade!



MUITO OBRIGADA!

DAB/SAS/Ministério da Saúde

www.saude.gov.br/dab

edneusa@saude.gov.br



Saúde da Família