

# UNIDADES DE REFERÊNCIA PARA TUBERCULOSE EM OLINDA

- POLICLÍNICA JOÃO DE BARROS BARRETO  
Av. Justino Gonçalves, s/n Carmo Olinda - PE
- POLICLÍNICA SÃO BENEDITO  
Rua Dunas, s/n - São Benedito
- UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

A SUA SAÚDE É A NOSSA META. FIQUE A VONTADE PARA PROCURAR A EQUIPE DOS CENTROS DE REFERÊNCIA SEMPRE QUE TIVER DÚVIDAS.



Ministério da Saúde



Diretoria de Vigilância à Saúde  
Departamento de Epidemiologia  
Programa de Controle da Tuberculose  
Rua do Sol, 311 Carmo Olinda - PE  
Fones: (081) 3305.1118  
(081) 3305.1115

# TUBERCULOSE

A stylized illustration of human lungs in white, showing the bronchial tree. The lungs are set against a red background that is part of a larger graphic design on the right side of the page.

COM O DIAGNÓSTICO  
**PRECOCE,**  
VOCÊ TEM 100%  
DE CHANCE DE  
**CURA**

# O QUE É TUBERCULOSE

A Tuberculose é uma doença contagiosa causada pelo “ Bacilo de Koch ” que se aloja preferencialmente no pulmão, mas pode atingir os rins, ossos, pele, intestino, etc., e se agrava caso não seja tratada.



## SINTOMAS

- Tosse com expectoração (catarro) por mais de 3 semanas;
- Febre, geralmente à tarde;
- Falta de apetite e emagrecimento;
- Dores nas costas e no peito;
- Fraqueza, desânimo e cansaço fácil;
- Suores noturnos.




## TRANSMISSÃO

A Tuberculose é transmitida através da tosse, espirro ou escarro de pessoas doentes, quando gotículas de secreção do pulmão são jogadas no ar que outras pessoas respiram.



## PREVENÇÃO

- Vacinação BCG em crianças menores de um ano e reforço na idade escolar previnem contra as formas graves da doença;
- Exame médico e de escarro em pessoas com tosse por mais de 3 semanas;
- Exame médico em pessoas que convivem com o doente.



## TRATAMENTO

È feito em nível ambulatorial por cerca de 6 meses e a medicação é gratuita.



Só é necessário internamento nos casos mais graves, como a meningite tuberculosa. Durante o tratamento os pacientes devem seguir as seguintes instruções:

- Tomar o medicamento diariamente;
- Parar de fumar ou diminuir o fumo;
- Continuar trabalhando sem esforços exagerados;
- Alimentar-se bem;
- Evitar bebidas alcoólicas;
- Comparecer ao Centro de Saúde todo mês para o acompanhamento do seu estado e entrega da medicação;
- Fazer os exames solicitados.

## CURA

O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura, mas o uso correto da medicação e o comparecimento regular ao Centro de Saúde, são imprescindíveis para que a cura ocorra em 6 meses.

