

LEMBRE-SE
As DST são porta de
entrada para o HIV
(vírus da AIDS).
Tratando as DST você
também se protege do
HIV.


Ligue gratuitamente:
DISQUE DST - AIDS
0800-162550



O uso correto de
preservativos (masculino ou
feminino) é fundamental na
prevenção de Doenças
Sexualmente
Transmissíveis.



O tratamento é gratuito em
todas unidades públicas de
saúde. Parceiros (as) de
pessoas com DST devem
receber o mesmo
tratamento.



CONHEÇA AS

DST

DOENÇAS SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS



CORRIMENTO FEMININO

CORRIMENTO FEMININO

O que é corrimento feminino?

Caracteriza-se por secreções vaginais de cor amarelada, esverdeada ou esbranquiçada, provocadas por fungos e bactérias. Podem exalar mau cheiro, provocar coceira ou ardor ao urinar.



Formas de transmissão

A contaminação pode ocorrer durante relações sexuais (oral, anal ou vaginal) desprotegidas, e durante a masturbação a dois, se um dos parceiros estiver infectado. Existe também chance de contágio ao se compartilhar roupas íntimas (calcinha, toalha de banho) com pessoas infectadas.

Candidíase

É uma doença provocada por fungos. Não é sexualmente transmissível. Entre seus sintomas estão coceira, ardor ou dor ao urinar, além de corrimento branco semelhante a "leite coalhado", acompanhado ou não de fissuras na vulva.

Cervicite

Corrimento vaginal, dor ao urinar e sangramento durante a relação sexual podem ser sinais de cervicite (inflamação da cervix). Esta pode ser provocada pelas bactérias causadoras de gonorréia e clamídia.

Tricomoníase

Costuma provocar corrimento abundante, amarelo ou esverdeado, com mau cheiro, além de coceira e irritação na vagina e vulva. Na maioria das vezes, o homem não apresenta sintomas, mas necessita de tratamento como sua parceira.

Gardnerella

O principal sintoma costuma ser cheiro de "peixe podre", especialmente após a relação sexual e no final da menstruação. Pode ser acompanhado ou não de corrimento de cor branca ou cinza.

