



MOSTRE A LÍNGUA PARA A PARALISIA INFANTIL.

VACINE SEU FILHO MENOR DE 5 ANOS,
MESMO QUE ELE JÁ TENHA SIDO VACINADO.

**15 DE AGOSTO,
DIA DA VACINAÇÃO.**



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Governor José Sarney
TUDO PELO SOCIAL

PROFESSORES NOTA DEZ

O Dia Nacional de Vacinação tem o objetivo de erradicar a Poliomielite; acabar de vez com a transmissão desta doença num prazo de três anos, ou seja, 1990.

O Ministério da Saúde espera que instituições, associações, sindicatos e outras organizações da sociedade se juntem às equipes de saúde no esforço para vacinar todas as crianças.

Entre as pessoas que fazem parte desses grupos, está você professor. Principalmente o professor do 1º Grau pois, com um contato mais direto com a população infantil, tem um canal quase que direto com os pais de alunos.

No Brasil, em 1979, registrou-se o número de 2500 casos de Poliomielite. De 1980 até 1983 este número caiu para 45 casos. Porém, em 1984 o número de casos aumentou para 130 e, em 1985 para 156. Isso aconteceu, porque o número de crianças vacinadas diminuiu. Só isso.

Para erradicar a Pólio em três anos, a participação de todos é muito importante. Para tanto, é preciso que todos saibam o que é a Poliomielite, a vacina, as campanhas de vacinação e a vigilância da doença, e que, você professor, assumira a sua parte na tarefa de acabar com esta doença no Brasil.

PEQUENAS INFORMAÇÕES SOBRE A PARALISIA INFANTIL

A Poliomielite, também chamada de paralisia infantil, é uma doença causada por um micróbio que ataca o sistema nervoso.

O poliovírus sai do organismo do doente pelas fezes ou quando o doente tosse, espirra ou fala. A pessoa sadia pega a poliomielite quando tem contato direto com essas fezes contaminadas, ou quando tem contato direto com o doente, mesmo que ele não apresente paralisia.

Para evitar a transmissão da Poliomielite é preciso:

- 1 - vacinar todas as crianças menores de cinco anos;
- 2 - fazer vigilância da Poliomielite, isto é, ficar atento ao aparecimento de pessoas com paralisia.

A vacina é o único meio disponível para evitar que as pessoas adoeçam de Poliomielite. A vacina é indicada a todas as crianças menores de cinco anos, porque é neste grupo de idade que acontece a maior parte dos casos da doença. A vacina antipólio oral é dada em três ou mais doses. Geralmente, cada dose corresponde a duas gotinhas. De uma dose para outra deve-se esperar dois meses.

A vacina antipólio existe em qualquer posto de saúde e em qualquer dia do ano. Além disso,

todos os anos, nos meses de maio e agosto, realizam-se campanhas de vacinação em todo o Brasil. Nessas campanhas mais Postos de Vacinação são organizados, para fazer com que a vacina antipólio chegue o mais próximo possível das crianças.

Na campanha de vacinação, todas as crianças, desde o dia em que nascem, até menores de cinco anos de idade, precisam ser vacinadas, mesmo que já tenham tomado várias doses da vacina anteriormente.

Outra coisa importante, é o registro da vacina aplicada. Durante a campanha, cada dose da vacina deve ser anotada na Caderneta de Vacinação, de acordo com a idade da criança que recebeu a vacina. Esta anotação vai ajudar as equipes de saúde a saber quantas crianças foram vacinadas e se toda a população de menos de cinco anos de idade está protegida contra a Poliomielite.

Professor, utilize este material na organização de trabalhos com seus alunos: cartas aos pais; levantamentos na comunidade, etc.

Professor, a sua participação é muito importante nesse contexto. Ajude a aumentar o número de crianças vacinadas.

Ajude a diminuir o número de casos de paralisia infantil em nosso Estado.

Seja um professor NOTA DEZ nesta tarefa.