


REALIZAÇÃO



FINANCIAMENTO

UNESCO



MINISTÉRIO DA SAÚDE
CNDST E AIDS

JOGUE CONTRA A AIDS, FAÇA SEXO SEGURO



DST

Doenças Sexualmente Transmissíveis

São transmitidas nas relações sexuais com pessoas contaminadas. Algumas delas nem se percebe no início, mas com o tempo se manifestam de forma grave.

As visitas ao médico periodicamente são muito importantes, principalmente para quem precisa se relacionar sexualmente com várias pessoas diariamente.

Não tome remédios caseiros ou sem receita médica, pois a doença poderá se agravar tornando a sua cura mais demorada. Procure sempre um Posto de Saúde.

Gonorréia (Esquentamento, corredeira) – você só pega esta doença através das relações sexuais sem camisinha. Seus sintomas são saída de pus pelo pênis e dificuldade para urinar.

Sífilis inicia com ferida no pênis, boca ou ânus, que desaparece em uma semana mesmo sem tratamento. Quando não tratada, a doença se instala no sangue e pode ter outras complicações. Tomar benzetacil sem receita médica pode esconder a doença.

Cancro mole (cavalo) – inicia-se sob forma de feridas no pênis e no ânus, que com o tempo tornam-se maiores e mais dolorosas.

Herpes genital são pequenas bolhas que aparecem nos órgãos genitais, ardem e coçam.

Condiloma (crista de galo) – inicia-se com pequenas verrugas na ponta do pênis ou no ânus. Quando não tratados se multiplicam podendo até formar tumores

AIDS

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

É provocada por um vírus chamado hiv, que pode ser encontrado no sangue, na baba que sai antes da ejaculação, no esperma, na secreção da vagina e no leite da mãe. Este vírus reduz o número de glóbulos brancos do corpo, enfraquecendo as defesas contra outras doenças.

Como se proteger da AIDS e DST's

Faça sexo sempre com camisinha!

Não importa como, nem onde, nem com quem, muito menos por quanto. Utilize somente agulhas e seringas descartáveis nas aplicações de drogas, hormônios ou silicone. Quem for HIV positivo ou doente por consequência da Aids não deve nunca ter relações sem camisinha, não só para evitar transmitir a doença como também para proteger-se de um aumento da quantidade de vírus.

ASSIM PEGA

RELAÇÃO SEXUAL

Todas as formas de transar que têm penetração (seja na vagina, no ânus ou na boca) podem passar o vírus da AIDS. TEM QUE USAR CAMISINHA!

TRANSFUSÃO DE SANGUE

Exija sangue com certificado de teste de AIDS, se você precisar de uma transfusão

TROCA DE SERINGAS

Se o sangue de uma pessoa contaminada fica na agulha ou dentro da seringa, o vírus passa para quem usar. PREFIRA SERINGAS DESCARTÁVEIS!

GRAVIDEZ E AMAMENTAÇÃO


A mulher contaminada pelo HIV passa o vírus para o feto na gravidez, no parto ou durante a amamentação. Faça o exame de sangue e controle pré-natal desde o começo da gravidez!

ASSIM NÃO PEGA

FICAR no mesmo ambiente, apertar a mão, trabalhar ao lado de alguém portador do HIV.

BEIJAR, dar carinho e atenção aos portadores do HIV.

PICADA de insetos.



PERGUNTE AIDS
0800-61 1997