

MAIS DIFÍCIL
AINDA É
NASCER
SOROPOSITIVO



Faça a sua parte!
Solicite o exame Anti-HIV
e sorologia para Sífilis
no pré-natal!
Lembre-se do aconselhamento!



Diretoria de Vigilância Epidemiológica
Divisão de Vigilância das DST/HIV/AIDS
e Sífilis Congênita



MINISTÉRIO
DA SAÚDE



É DIFÍCIL
DESCOBRIR
SER

SOROPOSITIVO...

Rotina de diagnóstico

VDRL

1ª Testagem - 1ª consulta pré-natal.

2ª Testagem - Início 3º trimestre de gestação.

3ª Testagem - na admissão para o parto, aborto ou curetagem.

Atenção: Em caso de teste reagente, tratar e realizar VDRL mensalmente.

HIV

1ª Testagem - 1ª consulta pré-natal.

2ª Testagem - Se história epidemiológica compatível (risco evidente na 1ª consulta). 3º trimestre.

Teste rápido quando:

- Gestante não testada no pré-natal;
- Resultados não disponíveis na admissão para o parto;
- História epidemiológica compatível.

Obs.: No resultado reagente é necessário uma segunda coleta para confirmação, mas a profilaxia deve ser iniciada.

LEMBRE-SE:

Gestante HIV +,

Criança exposta

ao HIV e

Sífilis Congênita,

a notificação é

OBRIGATÓRIA!