

Serviços de referência para acompanhamento da gestante com HIV/AIDS

João Pessoa

Hospital Universitário Lauro Wanderley -
Serviço de Assistência Especializada
(SAE) Materno-infantil - Telefax:
216-7821/216-7820

Campina Grande

ISEA-Instituto de Saúde Elpidio de Almeida-
Tel: 341-2007

Centros de Testagem

João Pessoa

CTA/COAS - Centro de Testagem Anônima/
Centro de Orientação e Apoio Sorológico -
Tel:218-5857/218-5860

Complexo de Doenças Infecto-Contagiosas
Clementino Fraga SAE-Serviço de Assistência
Especializada - Tel: 218-5411/218-5453

Hospital Universitário Lauro Wanderley -
SAE-Serviço de Assistência Especializada -
Tel:216-7821/216-7820

Maternidade Candida Vargas - Tel: 241-3441

Campina Grande

CTA/COAS - Centro de Testagem Anônima/
Centro de Orientação e Apoio Sorológico -
Centro de Saúde do Catolé - Tel:337-1327

Maternidades de Referência para Atendimento à Gestantes com HIV/AIDS

João Pessoa

Maternidade Frei Damião - Tel:241-3918
Hospital e Maternidade Gal. Edson
Ramalho - Tel:218-7979

Maternidade do Hospital Universitário
Lauro Wanderley - Tel:216-7098

Maternidade Candida Vargas - Tel:241-3441
Maternidade Santa Maria -Tel: 218-9727
Fax:238-7171



O seu bebê não precisa ter AIDS

A gravidez é um estado divino. Mas é preciso que você, futura mamãe, tome alguns cuidados para garantir a sua saúde e a saúde do seu bebê que está por vir. É necessário ter uma alimentação adequada e fazer alguns exames importantes, logo no início da gravidez. Um deles é o teste anti-HIV, porque você pode ter o vírus da AIDS e contaminar o seu bebê, mesmo sem saber. Você tem o dever e o direito de fazer os exames. Eles são necessários e gratuitos.

O que é AIDS?

A AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV que ataca as defesas do organismo e faz com que a pessoa infectada pegue outras doenças com mais facilidade.

Como se pega AIDS?

- * Em relações sexuais sem camisinha
- * Usando seringas e agulhas que outras pessoas já usaram
- * Na transfusão de sangue contaminado
- * No sexo oral
- * Da Mãe p/ o filho durante a gravidez, parto e aleitamento

Como a mãe transmite AIDS para o filho?

- * Durante a gravidez
 - * Durante o parto
 - * Na amamentação
- A transmissão vertical (da mãe para o filho) é a principal via de infecção pelo vírus HIV na população infantil. Em nosso país, essa forma de transmissão tem sido responsável por, aproximadamente, 98% dos casos notificados de AIDS em menores de 13 anos. Estima-se que de 15 a 30% das crianças nascidas de mães soropositivas adquirem o vírus na gestação, durante o trabalho de parto ou por meio de amamentação.

Mãe soropositiva, bebê soronegativo.

Como proteger seu filho:

- * Use camisinha mesmo durante a gravidez.
- * Não fume, não beba e não use drogas.
- * Não tome nenhum remédio sem orientação médica.
- * Não faça nenhum tipo de radiografia durante a gravidez. (Exceto por orientação médica)
- * Compareça regularmente ao pré-natal e siga todas as orientações médicas.
- * Comece logo a fazer o tratamento com o AZT e outros antiretrovirais, se necessário. O tratamento é gratuito e deve se estender até o parto. Quanto antes começar, maiores as chances do seu bebê nascer sadio.
- * O bebê tem que tomar o AZT até um mês e meio de idade. (42 dias)
- * Mãe soropositiva não pode amamentar. Você pode passar o vírus da AIDS para o seu filho através do leite materno.
- * Procure orientação médica para saber como alimentar o seu bebê.

“Você tem o direito e o dever de fazer os exames. Eles são necessários e gratuitos”.