



Ministério da Saúde



MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

Versão Horizontal e Corer



Versão Vertical e Corer



Corer Padrão

PANTONE 116 C	PANTONE 276 C	PANTONE BLACK
Cyan 0%	Cyan 100%	Cyan 0%
Magenta 10%	Magenta 85%	Magenta 0%
Amarillo 100%	Amarillo 35%	Amarillo 0%
Preto 0%	Preto 35%	Preto 100%

Versão Horizontal e Traço Positivo



Versão Horizontal Monocromática Negativa



Versão Horizontal e Traço Negativo



Relação de Uso



Relação de Uso



Aplicação em Embalagens Secundárias - Tapa Vermelha

Lote, data de fabricação e validade: Qualquer campo exceto face frontal, faixas e rodapés do cartucho.



Planificação




Nos casos de aplicação em Embalagens Secundárias - Tapa Vermelha - Preto ou sem tapa) o logotipo Medicamento Genérico se apresenta obrigatoriamente na versão a cores. A faixa amarela deve se estender pelas laterais da embalagem.

Aplicação em Embalagens Secundárias - Sem Tarja




Planificação




Obs: Deve constar das embalagens com alertas obrigatórios as frases respectivas constantes da legislação

Exemplo de aplicação em embalagens de Proporções Verticais (altura da face principal maior que a largura)




Tamanho do logotipo medicamentos genéricos definido pela altura da face principal da embalagem

Aplicação em Embalagens Secundárias - Tarja Preta




Planificação



*Dizeres conforme a Portaria SVS/MS n° 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações

Exemplo de aplicação em embalagens de Proporções Verticais (altura da face principal maior que a largura)



Tamanho do logotipo medicamentos genéricos definido pela largura da face principal da embalagem





Figura 3 - Impresso paralelo e perpendicular ao maior eixo do recipiente



Exemplo de aplicação em embalagens de Proporções Horizontais (largura da face principal maior que a altura)




Nos casos de embalagens de proporções horizontais (blisters, blisters, etc) adotar o logotipo Medicamentos Genéricos Versão Vertical, devendo ser aplicado na extremidade direita da embalagem antes a faixa prescrição médica.



Tamanho do logotipo medicamentos genéricos definido pela largura da face principal da embalagem

ANEXO II

Figura 1 - Ampola com representação do rótulo.



ANEXO III

Tabela 1 - Soluções concentradas com acetato ou lactato

	MMol / L	mEq/L
Acetato ou lactato (equivalente a bicarbonato)	32,0 - 45,0	32,0 - 45,0
Cálcio	1,0 - 2,0	2,0 - 4,0
Cloreto	90,0 - 120	90,0 - 120
Magnésio	0,25 - 1,2	0,5 - 2,4
Potássio	0,0 - 3,0	0,0 - 3,0
Sódio	130,0 - 145,0	130,0 - 145,0
Glicose	0,0 - 12,0	

Tabela 2 - Soluções concentradas ácidas, SEM ADIÇÃO DE BICARBONATO:

	MMol / L	MEq/L
Ácido Acético	2,5 - 10,0	2,5 - 10,0
Cálcio	1,0 - 2,0	2,0 - 4,0
Cloreto	90,0 - 120	90,0 - 120
Magnésio	0,25 - 1,2	0,5 - 2,4
Potássio	0,0 - 3,0	0,0 - 3,0
Sódio	80,0 - 110,0	80,0 - 110,0
Glicose	0,0 - 12,0	

NOTA: Soluções de bicarbonato de sódio ou bicarbonato de sódio sólido, para serem adicionadas imediatamente antes do uso, devem ser fornecidas em quantidades que não ultrapassem a concentração de 45 mMol/L ou 45 mEq/L no produto diluído. Neste caso, deve considerar o somatório dos íons sódio na concentração final diluída das soluções concentradas ácidas.

ANEXO IV

Figura 1 - Imagens para dessecantes

