

LISTA I: SUBSTÂNCIAS QUE NECESSITAM DE FRASES DE ALERTA

Substância	Frases de alerta		
	Bula para o paciente	Bula para o profissional da saúde	Rotulagem
Ácido acetilsalicílico	1; 3; 5; 11	1; 4; 6; 12	2; 3; 5
Ácido bórico e seus derivados (exceto em soluções oftálmicas)	7; 9	8; 10	7; 9
Ácido mefenâmico	11; 13; 97	12; 13; 98	13; 97
Acitretina	14; 16; 18	15; 17; 19	-
Alcool benzílico	20	21	22
Alumínio (soluções parenterais)	23	24	-
Amarelo de tartrazina	13	13	13
Benzoato de sódio	13	13	13
Cânfora	25	26	25
Cetoprofeno	1; 11; 13; 97	1; 12; 13; 98	2; 13; 97
Cetorolaco (oral)	1; 27; 97	1; 27; 98	2; 97
Cetorolaco (parenteral)	1; 28; 97	1; 28; 98	2; 97
Ciproterona	47	48	-
Clozapina	29	30	-
Corante	31	31	31
Danazol	18	19	-
Diclofenaco sódico e potássico (oral)	1; 11; 13; 97	1; 12; 13; 98	2; 13; 97
Diclofenaco sódico e potássico (parenteral)	1; 11; 13; 32; 97	1; 12; 13; 33; 98	2; 13; 97
Dutasterida	18	19	-
Etanol	34	34	35
Etretinato	36	37	-
Fenilalanina ou componentes metabolizados em fenilalanina	38	38	38
Fenilbutazona	13	13	13
Finasterida	18	19	-
Fosfato de sódio (oral)	39	40	-
Fosfato de sódio (retal)	-	41	-
Flurbiprofeno	1; 11; 13; 97	1; 12; 13; 98	2; 13; 97
Glicose ou dissacarídeos (sacarose, lactose e maltose)	42	43	44
Glúten	45	46	45
Hormônio do crescimento hipofisário humano	36	37	-
Hormônio do crescimento recombinante	36	37	-
Ibuprofeno	1; 11; 13; 97	1; 12; 13; 98	2; 13; 97
Indometacina	1; 11; 13; 97	1; 12; 13; 98	2; 13; 97
Insulina bovina	36	37	-
Isotretinoína	18; 47; 49	19; 48; 50	-
Lenalidomida	18	19	-
Naproxeno	1; 11; 13; 97	1; 12; 13; 98	2; 13; 97
Nimesulida	1; 11; 47; 97	1; 12; 48; 98	2; 97
Paracetamol	51; 52; 54	53; 55	56
Potássio (oral e parenteral)	57	58	-
Sódio (oral, retal e parenteral)	59	60	-
Sulfito	61	62	63
Tacrina	47	48	-
Testosterona	18	19	-
Classe terapêutica	Frases de alerta		
	Bula para o paciente	Bula para o profissional da saúde	Rotulagem
Analgésicos opióides	64; 66	65; 66	-
Ansiolíticos	64; 66	65; 66	-
Antiarrítmicos	69	70	-
Antibacterianos	71	72	73
Anticoagulantes, antitrombócitos e demais medicamentos que apresentam potencial hemorrágico	67	68	-
Anticoncepcionais	74	75	76
Anticoncepcionais orais combinados	74; 76; 78	75; 77; 79	-
Antidepressivos	64; 66	65; 66	-
Antiepiléticos	64; 66	65; 66	-
Anti-hipertensivos	66; 80	66; 81	-
Anti-histamínicos	64	65	-
Antiinflamatórios não esteroidais	1; 11; 97	1; 12; 98	2; 97
Antiparkinsonícos	64; 66	65; 66	-

Antipsicóticos	64; 66	65; 66	-
Antirretrovirais sujeitos a controle especial	73	73	73
Entorpecentes e psicotrópicos sujeitos a controle especial	82	82	82
Hipnóticos	64; 66	65; 66	-
Imunossupressores	67; 83; 85	68; 84; 86	-
Medicamentos com atividade de hormônio da tireóide	87	88	87
Medicamentos cujo uso contraindica a doação de sangue apenas durante o tratamento	69	70	-
Medicamentos cujo uso contraindica a doação de sangue durante e após o término do tratamento	18	19	-
Medicamentos cujo uso provoca inaptidão definitiva para doação de sangue	36	37	-
Medicamentos que necessitam da monitorização periódica da função hepática.	47	48	-
Nitrovasodilatadores	66; 80; 89	66; 81; 90	-
Psicoestimulantes	64; 66	65; 66	-
Psicotrópicos anorexígenos sujeitos a controle especial (exceto a sibutramina)	82; 91	82; 91	82; 91
Quinolonas	64	65	-
Salicilatos	1	1	2
Sedativos	64; 66	65; 66	-
Supressores da tosse com codeína	92	93	-
Vacinas	94	95	-
Vacinas contendo compostos mercuriais, como o tiomersal	94; 96	95; 96	-
Vasodilatadores	66; 80	66; 81	-

LISTA II: SUBSTÂNCIAS E SUAS CATEGORIAS DE RISCO NA GRAVIDEZ E NO ALEITAMENTO

Substância	Categoria de risco na gravidez	Aleitamento (Compatível/ Criterioso/ Contraindicado)	Frases				
			Bula para o paciente		Bula para o profissional da saúde		Rotulagem
abacavir	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
abciximabe	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
acamprosat	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
acarbose	B	Contraindicado	503	518	504 ou 505	520	-
acebutolol	B (D se usado no 2º ou 3º trimestres)	Contraindicado	503;508	518	504 ou 505; 509	520	-
aceclofenaco	C	Compatível	503	516	506 ou 507	519	-
acemetacina	C	Compatível	503	516	506 ou 507	519	-
acenocumarol	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
acetato de glatirâmer	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
acetazolamida	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
acetilcisteína	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
aciclovir	C	Compatível	503	516	506 ou 507	519	-
ácido acetilsalicílico	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
ácido alendrónico	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
ácido aminocaprílico	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
ácido ascórbico	A (C se usado em doses acima das necessidades diárias)	Compatível em doses usuais	503	516	506 ou 507	519	-
ácido cítrico	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
ácido clavulânico	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
ácido clodrônico	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
ácido cromoglicólico	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
ácido etidrônico	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
ácido fólico	A (C se usado em doses acima das necessidades diárias)	Compatível	503	516	506 ou 507	519	-
ácido fusídico	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
ácido mefenâmico	C (D se usado no 3º trimestre ou perto do parto)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
ácido nalidíxico	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
ácido nicotínico	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
Acido pamidrônico	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
ácido quenodesoxicólico	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
ácido tiaprofênico	C (D se usado no 3º trimestre ou perto do parto)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
ácido tranexâmico	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
ácido ursodesoxicólico	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
ácido valpróico	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
acitretina	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	515
adapaleno	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	515
adenosina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
albendazol	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
alfaepoetina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
alfafolitropina	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
alfainterferona 2a	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
alfainterferona 2b	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
alfapeginterferona 2a	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
alfapeginterferona 2b	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
almitrina	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
almotriptana	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
alopurinol	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
alprazolam	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
alprostadil	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
alteplase	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
amantadina	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
amicacina	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
amifostina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
amilorida	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
aminofilina	C	Compatível	503	516	506 ou 507	519	-
aminoglutetimida	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
amiodarona	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
amissulprida	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
amitriptilina	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
amorolfina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
amoxicilina	B	Compatível	503	516	504 ou 505	519	-
ampicilina	C	Compatível	503	516	506 ou 507	519	-
amprenavir	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
anfepiramona	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
anfotericina B	B	Contraindicado	503	518	504 ou 505	520	-
anisindiona	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
anlodipino	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
ansacrina	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
antazolina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
apomorfina	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
apraclonidina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
aprotinina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
arginina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
articaína	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
asparaginase	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
aspartato de arginina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-

atenolol	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
atorvastatina	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
atracúrio	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
atropina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
auranofina	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
aurotiomalato de sódio	C	Compatível	503	516	506 ou 507	519	-
azapropazona	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
azatadina	B (D se usado duas semanas antes do parto)	Contraindicado	503;508	518	504 ou 505; 509	520	-
azatioprina	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
azelastina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
azintamida	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
azitromicina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
aztreonam	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
bacitracina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
baclofeno	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
beclometasona	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
bendroflumetiazida	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
benfluorex	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
benserazida	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
benzoato de benzila	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
benzocaína	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
besilato de atracúrio	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
betafolitropina	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
betainterferona 1a	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
betainterferona 1b	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
betametasona	C (D se usado no 1º trimestre)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
betaxolol	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
bexaroteno	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	515
bezafibrato	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
bicarbonato de sódio	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
bimatoprost	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
biperideno	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
bisoprolol	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
bleomicina	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
brinzolamida	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
bromazepam	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
bromelaina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
brometo de distigmina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
brometo de ipratrópio	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
brometo de piridostigmina	C	Compatível	503	516	506 ou 507	519	-
bromexina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
bromocriptina	B	Contraindicado	503	518	504 ou 505	520	-
bronfeniramina	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
brotizolam	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
buclicina	C (D se usado duas semanas antes do parto)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
budesonida (inalatória)	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
budesonida (oral)	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
bumetanida	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
bupivacaína	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
buprenorfina	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
bupropiona	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
buspirona	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
bussulfano	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
cafeína	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
calcifediol	C (D se usado em doses acima das necessidades diárias)	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	-
calcitonina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
calcitriol	C (D se usado em doses acima das necessidades diárias)	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	-
candesartana	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Contraindicado	503;508	518	506 ou 507; 509	520	-
cânfora	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
captopril	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
carbamazepina	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
carbenoxolona	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
carbidopa	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
carbimazol	D	Compatível	503;508	516	509	519	513
carbocisteína	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
carbonato de cálcio	A (D se usado em doses acima das necessidades diárias)	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	-
carbonato de magnésio	A	Criterioso	501	516 ou 517	502	519	-
carboplatina	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
carisoprodo	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
carmustina	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
carteolol	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
carvedilol	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
cefaclor	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
cefadroxila	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
cefalexina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
cefatrizina	B	Compatível	503	516	504 ou 505	519	-
cefeprozila	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
cefetamete	B	Compatível	503	516	504 ou 505	519	-
cefixima	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
cefodizima dissódica	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
cefonicida	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
cefotaxima	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
cefotaxima	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
cefotaxima	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
cefotaxima	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
cefotaxima	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
cefotaxima	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
cefotaxima	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
cefotaxima	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
cefotaxima	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
cefotaxima	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
cefotaxima	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
celecoxibe	C (até a 29ª semana de gestação) ou D (com 30 ou mais semanas de gestação)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
cetirizina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
cetoconazol	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
cetoprofeno	B (D se usado no 3º trimestre ou perto do parto)	Criterioso	503;508	516 ou 517	504 ou 505; 509	519	-
cetorolaco	C (D se usado no 3º trimestre)	Contraindicado	503;508	518	506 ou 507; 509	520	-
cetotifeno	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-

ciamemazina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
cianocobalamina	A (C se usado em doses acima das necessidades diárias; intranasal ou injeção)	Compatível	503	516	506 ou 507	519	-	
ciclandelato	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
ciclindol	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
ciclobenzaprina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-	
ciclofosfamida	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513	
ciclopentiazida	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
ciclopirox olamina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-	
ciclosporina	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-	
ciclosserina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
cidofovir	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513	
cilastatina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
cilazapril	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513	
cimetidina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-	
cinarizina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
ciprofibrato	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
ciprofloxacino	C (D se usado no 1º trimestre)	Contraindicado	503;508	518	506 ou 507; 509	520	-	
ciproterona	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513	
cisaprida	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
cisplatina	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513	
citarabina	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513	
citicolina	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513	
nitidina	citrato bismútico de ra-	C	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
	citrato de potássio	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
	citrulina	A	Criterioso	501	516 ou 517	502	519	-
	claritromicina	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
	clemastina	C (D se usado duas semanas antes do parto)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
	clenbuterol	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
	clindamicina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
	clobazam	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
	clobetasol	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	clobetasona	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	clofazimina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	clofibrato	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
	clomifeno	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
	clomipramina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	clonazepam	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
	clonidina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	clopidogrel	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	clorambucila	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
	cloranfenicol	C (D se usado perto do parto)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
	clorazepato dipotássico	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
	clordiazepóxido	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
	cloreto de amônio	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	cloreto de potássio	C	Compatível	503	516	506 ou 507	519	-
	clorexidina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	clorfeniramina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	clorfenoxamina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	cloroquina	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
	clorotiazida	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
	clorpromazina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	clorpromazina	C (D se usado perto do parto)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
	clortalidona	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
	clortetraciclina	D	Compatível	503;508	516	509	519	513
	clotrimazol	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	clozapina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	codeína	C (D se usado por períodos longos ou em doses altas)	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	-
	colecalfiferol	C (D se usado em doses acima das necessidades diárias)	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	-
	colestipol	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	colestiramina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	cortisona	C (D se usado no 1º trimestre)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
	dacarbazina	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
	dactinomicina	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
	dalteparina sódica	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	danazol	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
	dantroleno	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	dapsona	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	daunorrubicina	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
	deflazacorte	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
	desferroxamina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	desloratadina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	desmopressina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
	desogestrel	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
	dexonida	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	dexametasona	C (D se usado na 1ª metade da gravidez)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
	dexbronfeniramina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	dexcetoprofeno	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	dexclorfeniramina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
	dexibuprofeno	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
	dextroalfatocoferol	A (C se usado em doses acima das necessidades diárias)	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	dextrometorfano	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	dextropropoxifeno	C (D se usada por períodos longos)	Criterioso	503;508	516 ou 517	?	519	-
	diazepam	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
3%)	diclofenaco (tópico a	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
	diclofenaco (oftálmico)	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
mais)	diclofenaco (oral e de-	C (D se usado na 30ª semana ou mais de gravidez)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
	dicloxacilina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
	dicumarol	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	520	513
	didanosina	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
	didrogesterona	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
	difenidramina	B	Contraindicado	503	518	504 ou 505	520	-
	difenoxilato	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	diflucortolona	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	digoxina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
	di-hidralazina	C	Compatível	503	516	506 ou 507	519	-

di-hidrocodeína	B (D se usado por períodos longos ou em doses altas)	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	-
di-hidroergotamina	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
diltiazem	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
dimenidrinato	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
dimeticona	B	Compatível	503	516	504 ou 505	519	-
dimetindeno	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
dinitrato de isossorbida	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
dipiridamol	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
dipirona magnésica	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
diprofilina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
disopiramida	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
dissulfiram	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
dobutamina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
docetaxel	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
domperidona	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
dorzolamida	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
dosulepina	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
doxazosina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
doxiciclina	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
doxorubicina	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
drosiprenona + etinilestradiol	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
dutasterida	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
ebastina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
econazol	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
efavirenz	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
efedrina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
eletriptana	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
enalapril	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
enoxaparina sódica	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
entacapona	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
entricitabina	B	Contraindicado	503	518	504 ou 505	520	-
epinastina	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
epinefrina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
eprosartana	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
eptifibatida	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
ergocalciferol	C (D se usado em doses acima das necessidades diárias)	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	-
ergotamina	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
eritromicina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
escitalopram	C (D se usado na 2ª metade da gravidez)	Contraindicado	503;508	518	506 ou 507; 509	520	-
esomeprazol	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
espectinomomicina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
espiramicina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
espirolactona	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
estavudina	C (X se usado no 1º trimestre)	Contraindicado	503;510	518	506 ou 507; 511; 512	520	-
estazolam	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
estradiol	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
estramustina	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
estreptomicina	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
estreptoquinase	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
estriol	X	Compatível	510	516	511; 512	519	514
estrogênios conjugados	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
etambutol	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
etilefrina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
etinilestradiol	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
etionamida	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
etodolaco	C (D se usado no 3º trimestre ou perto do parto)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
etofibrato	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
etoposídeo	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
etoricoxibe	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
ezetimiba	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
famotidina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
felbamato	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
felodipino	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
fembufeno	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
fenilbutazona	C (D se usado no 3º trimestre ou perto do parto)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
fenilefrina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
fenitoína	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
fenobarbital	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
fenofibrato	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
fenoterol	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
fenotiazina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
fenoxibenzamina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
fenoximetilpenicilina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
fentanila	C (D se usado por períodos longos ou em doses altas)	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	-
fenticonazol	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
fenolamina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
fexofenadina	C (D se usado duas semanas antes do parto)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
filgrastim	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
finasterida	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
fisostigmina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
fitomenadiona	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
flavoxato	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
flecainida	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
flubendazol	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
fluconazol	C (X se usado no 1º trimestre)	Compatível	503;510	516	506 ou 507; 511; 512	519	-
fludarabina	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
fludrocortisona	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
flufenazina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
flumazenil	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
flunisolida	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
flunitrazepam	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
fluoresceína	C	Contraindicado para menores de 1 mês de vida ou prematuros	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
fluormetolona	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
fluoruracila	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
fluoxetina	C (D se usado na 2ª metade da gravidez)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-

fluoximesterona	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
flupentixol	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
flurazepam	X	Crterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
flurbiprofeno	C (D se usado no 3º trimestre ou perto do parto)	Crterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
flutamida	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
fluticasona	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
fluvastatina	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
fluvoxamina	C (D se usado na 2ª metade da gravidez)	Crterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
fondaparinux sódico	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
formoterol	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
foscarnete sódico	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
fosfenitoína	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
fosfomicina	B	Crterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
fosinopril	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Crterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
furosemida	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
gabapentina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
galantamina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
gamainterferona 1b	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
ganciclovir	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
gencitabina	X	Crterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
genfibrozila	X	Crterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
gentamicina (oral e demais)	D	Compatível	503;508	516	509	519	513
gentamicina (oftálmico e tópico)	C	Compatível	503	516	506 ou 507	519	-
gestodeno	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
gestrinona	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
glibenclamida	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
glicerol	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
gliclazida	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
glimiperida	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
glipizida	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
glucagon	B	Crterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
gonadotropina coriônica	X	Crterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
gossrelina	X	Crterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
griseofulvina	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
guaifenesina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
halazepam	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
halofantrina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
halometasona	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
haloperidol	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
heparina sódica	C	Compatível	503	516	506 ou 507	519	-
hesperidina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
hidroclorotiazida	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
hidrocortisona	C (D se usado no 1º trimestre)	Crterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
hidroflumetiazida	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
hidromorfona	B (D se usado por períodos longos ou em doses altas)	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	-
hidroxiclorequina	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
hidróxido de alumínio	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
hidróxido de magnésio	A	Compatível	501	516	502	519	-
hidroxiprogesterona	C (D se usado antes das primeiras 16 semanas)	Crterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
hidroxizina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
ibuprofeno	B (D se usado no 3º trimestre)	Crterioso	503;508	516 ou 517	504 ou 505; 509	519	-
idarrubicina	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
idebenona	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
idoxuridina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
ifosfamida	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
imidapril	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
imipeném + cilastatina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
imipramina	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
imiquimode	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
imunoglobulina humana	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
indapamida	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
indapamida	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
indinavir	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
indobufeno	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
indometacina	B (D se usado durante mais de 48 horas ou após a 34ª semana de gestação ou perto do parto)	Crterioso	503;508	516 ou 517	504 ou 505; 509	519	-
infiximabe	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
insulina	B	Crterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
iodeto de potássio	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
iodopovidona	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
iodopovidona (oftálmica)	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
irbesartana	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Contraindicado	503;508	518	506 ou 507; 509	520	-
irinotecano	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
isoniazida	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
isotretinoína	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	515
isradipino	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
itraconazol	C (D se usado no 1º trimestre)	Crterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
labetalol	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Crterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
lacidipino	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
lactitol	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
lactobacillus acidophilus	A	Crterioso	501	516 ou 517	502	519	-
lactulose	B	Crterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
lamivudina	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
lamotrigina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
lanreotida	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
lansoprazol	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
latanoprost	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
leflunomida	X	Crterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
lenograstim	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
letrozol	X	Crterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
leuprorrelina	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
levetiracetam	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
levocabastina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
levocarnitina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
levocetirizina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
levodopa	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-

levofloxacino	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
levomepromazina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
levonorgestrel	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
levotiroxina	A	Compatível	501	516	502	519	-
levotiroxina sódica	A	Compatível	501	516	502	519	-
lidocaína	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
lincomicina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
lindano	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
linestrenol	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
lisado de Escherichia coli	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
lisinopril	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
lítio	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
lomustina	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
loperamida	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
lopinavir	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
loprazolam	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
loratadina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
lorazepam	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
lormetazepam	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
losartana	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
lovastatina	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
macrogol	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
manitol	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
maprotilina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
mebendazol	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
mebeverina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
meclozina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
medroxiprogesterona	X	Compatível	510	516	511; 512	519	514
mefloquina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
megestrol	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
melfalana	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
meloxicam	C (D se usado no 3º trimestre)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
memantina	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
mepivacaína	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
mequitazina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
mercaptapurina	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
meropeném	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
mesalazina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
mesilato de di-hidroergotamina	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
mesterolona	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
metadona	B (D se usado por períodos longos ou em doses altas)	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	-
metformina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
metildopa	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
metilfenidato	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
metilprednisolona	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
metiltestosterona	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
metoclopramida	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
metolazona	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
metoprolol	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Contraindicado	503;508	518	506 ou 507; 509	520	-
metotrexato	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
metronidazol	B (X se usado no 1º trimestre)	Criterioso (Pode ser contraindicado no 1º trimestre)	503;510	516 ou 517	504 ou 505; 511; 512	519	-
mianserina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
mibefradil	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
micofenolato de mofetila	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
miconazol	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
midazolam	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
milnaciprana	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
minociclina	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
minoxidil	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
mirtazapina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
misoprostol	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
mitomicina	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
mitoxantrona	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
mizolastina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
moclobemida	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
modafinila	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
molgramostim	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
mononitrato de isossorbida	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
montelucaste	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
morfina	C (D se usado por períodos longos ou em doses altas)	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	-
moxifloxacino	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
moxonidina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
mupirocina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
mustina	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
nabumetona	C (D se usado no 3º trimestre ou perto do parto)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
nadolol	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
nadroparina cálcica	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
nafazolina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
naloxona	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
naltrexona	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
nandrolona	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
naproxeno	C (D se usado no 3º trimestre ou perto do parto)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
naratriptana	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
nateglinida	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
neбивolol	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
nedocromila dissódica	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
nelfinavir	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
neomicina	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
neostigmina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
netilmicina	D	Compatível	503;508	516	509	519	513
nevirapina	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
nicardipino	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
nicorandil	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
nicotina	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513

nicotinamida	A (C se usado em doses acima das necessidades diárias)	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
nifedipino	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
nimesulida	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
nimodipino	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
nistatina (vaginal)	A	Crterioso	501	516 ou 517	502	519	-
nistatina (oral e demais)	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
nitrofurantoína	B	Crterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
nitroglicerina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
nitroprusseto de sódio	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
nizatidina	B	Crterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
nonoxinol	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
nordazepam	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
noretisterona	X	Crterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
norfloxacino	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
norgestrel	X	Compatível	510	516	511; 512	519	514
nortriptilina	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
octreotida	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
ofloxacino	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
olanzapina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
olmesartana	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Contraindicado	503;508	518	506 ou 507; 509	520	-
olopatadina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
omeprazol	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
omoconazol	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
ondansetrona	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
orfenadrina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
orlistate	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
oseltamivir	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
ouro, sais de	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
oxatomida	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
oxazepam	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
oxibutinina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
oxicodona	B (D se usado por períodos longos ou em doses altas)	Contraindicado	503;508	518	509	520	-
oximetazolina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
oxitetraciclina	X	Crterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
oxitriptana	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
paclitaxel	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
pancreatina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
pancurônio	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
pantoprazol	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
papaverina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
paracetamol	B (D se usado em doses elevadas)	Compatível	503;508	516	?	519	-
paroxetina	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
pegvisomanto	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
penicilamina	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
penicilina	B	Compatível	503	516	504 ou 505	519	-
pentamidina	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
pentazocina	C (D se usado por períodos longos ou em doses altas perto do parto)	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	-
pentoxifilina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
pepsina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
perfenazina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
pergolida	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
perindopril	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Crterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
permetrina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
picetoprofeno	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
pilocarpina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
pimecrolimo	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
pimozida	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
pioglitazona	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
piperacilina	C (se usado no 1º e 2º trimestres) ou B (se usado no 3º trimestre)	Crterioso	503	516 ou 517	504 ou 505; 506 ou 507	519	-
piperazina	B	Crterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
piracetam	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
pirantel	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
pirazinamida	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
pirenzepina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
piridoxina	A (C se usado em doses acima das necessidades diárias)	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
pirimetamina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
piritinol	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
piroxicam	C (D se usado no 3º trimestre ou perto do parto)	Crterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
podofilotoxina	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
policlesuleno	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
polimixina B	B	Crterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
politiázida	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
pramipexol	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
pravastatina	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
prazepam	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
praziquantel	C (D se usado no 1º trimestre)	Crterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
prednisolona	C (D se usado no 1º trimestre)	Crterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
pregabalina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
prilocaína	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
primidona	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
procaína	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
procarbazina	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
procatérol	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
progesterona	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
proglumetacina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
proglumida	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
proguanil	B	Crterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
promestrieno	B	Crterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
prometazina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
propafenona	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
propiltiouracila	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
propranolol	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Crterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
pseudoefedrina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
quazepam	X	Crterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
quetiapina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-

quinapril	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Crterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
quinidina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
quinina	X	Crterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
rabeprazol	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
racecadotriila	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
raloxifeno	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
ramipril	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Crterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
ranitidina	B	Crterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
reboxetina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
reteplase	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
retinol	X	Crterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	515
reviparina sdica	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
ribavirina	X	Crterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
riboflavina	A (C se usado em doses acima das necessidades dirias)	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
rifampicina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
rilmenedina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
rimexolona	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
risedronato sdico	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
risperidona	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
ritodrina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
ritonavir	B	Contraindicado	503	518	504 ou 505	520	-
rivastigmina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
rizatriptana	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
rofecoxibe	C (D se usado no 3º trimestre ou perto do parto)	Contraindicado	503;508	518	506 ou 507; 509	520	-
ropinirol	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
ropivacaína	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
rosiglitazona	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
rosuvastatina	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
roxitromicina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
rupatadina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
salbutamol	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
salmeterol	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
saquinavir	B	Contraindicado	503	518	504 ou 505	520	-
secnidazol	C (D se usado no 1º trimestre)	Contraindicado	503;508	518	506 ou 507; 509	520	-
selegilina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
sertaconazol	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
sertralina	C (D se usado na 2ª metade da gravidez)	Crterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
sevelâmer	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
sibutramina	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
sildenafil	B	Crterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
silimarina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
simeticona	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
sinvastatina	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
sirolimo	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
solifenacina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
somatostatina	B	Crterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
somatropina	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
sotalol	C (D se usado no 1º e 3º trimestres)	Crterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
sucralfato	B	Crterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
sulfadiazina	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
sulfametoxazol + trimetoprma	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
sulfassalazina	B (D se usado perto do parto)	Contraindicado em menores de 1 mês de vida ou prematuros	503;508	516 ou 517	504 ou 505; 509	519	-
sulfato de magnésio	C	Compatível	503	516	506 ou 507	519	-
sulfato de protamina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
sulfeto de selênio	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
sulindaco	C (D se usado no 3º trimestre ou perto do parto)	Crterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
sulpirida	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
sumatriptana	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
tacalcitol	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
tacrolimo	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
tamoxifeno	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
tartarato de ergotamina	X	Crterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
tazobactam	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
teicoplanina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
telitromicina	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
telmisartana	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Crterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
temazepam	X	Crterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
temozolomida	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
tenecteplase	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
teniposídeo	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
tenofovir	B	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
tenoxicam	C (D se usado no 3º trimestre)	Crterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
teofilina	C	Compatível	503	516	506 ou 507	519	-
terazosina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
terbinafina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
terbutalina	B	Crterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-
terfenadina	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
teriparatida	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
testosterona	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514
tetraciclina	X	Crterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514
tetracosactida	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
tetrizolina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
tiagabina	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513
tiamazol	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
tiamina	A (C se usado em doses acima das necessidades dirias)	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
tiaprida	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
ticlopidina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
timolol	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Crterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-
tinidazol	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-
tinzaparina sdica	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
tiocolchicosídeo	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
tiocanazol	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
tioguanina	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513
tioridazina	C	Crterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-
tiotepa	D	Crterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513

tirofibana	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-	
tiropramida	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
tizanidina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
tobramicina	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513	
tobramicina (oftálmica)	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-	
tolterodina	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513	
topiramato	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513	
topotecana	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513	
tramadol	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
tramazolina	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-	
trandolapril	C (D se usado no 2º e 3º trimestres)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-	
trazodona	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
tretinoína	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	515	
tretinoína (tópica)	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513	
triancinolona	C (D se usado no 1º trimestre)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-	
triantereno	C (D se usado no 1º e 3º trimestres)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-	
triazolam	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514	
trixifenidil	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
triflusal	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
trimebutina	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514	
trimeperidina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
trimetadiona	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514	
trimetoprima	C (D se usado no 1º trimestre)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-	
trimipramina	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-	
triprolidina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
tromantadina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
tropisetrona	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
tulobuterol	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
urofolitropina	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514	
uroquinase	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-	
vacina contra difteria e tétano	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
vacina contra Haemophilus influenzae tipo b	C	Compatível	503	516	506 ou 507	519	-	
vacina contra hepatite A	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
vacina contra hepatite B	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
vacina contra hepatite B	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
vacina contra pneumococos	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
vacina contra rubéola, sarampo e caxumba	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514	
vacina contra varicela	X	Criterioso	510	516 ou 517	511; 512	519	514	
valaciclovir	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-	
valdecoxibe	C (D se usado no 3º trimestre)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-	
valsartana	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513	
vancomicina (oral)	B	Criterioso	503	516 ou 517	504 ou 505	519	-	
vancomicina (parenteral)	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
varfarina	X	Contraindicado	510	518	511; 512	520	514	
vecurônio	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
venlafaxina	C (D se usado na 2ª metade da gravidez)	Criterioso	503;508	516 ou 517	506 ou 507; 509	519	-	
verapamil	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
vigabatrina	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513	
vincristina	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513	
vindesina	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513	
vinorelbina	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513	
ximelagatrana	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513	
xipamida	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513	
zafirlucaste	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-	
zalcitabina	D	Contraindicado	503;508	518	509	520	513	
zanamivir	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
zidovudina	C	Contraindicado	503	518	506 ou 507	520	-	
ziprasidona	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
zofenopril	D	Criterioso	503;508	516 ou 517	509	519	513	
zolmitriptana	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
zolpidem	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
zopiclona	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
zotepina	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
zuclopentixol	C	Criterioso	503	516 ou 517	506 ou 507	519	-	
Classe terapêutica	Categoria de risco na gravidez	Aleitamento (Compatível/ Criterioso/ Contraindicado)	Frases					
			Bula para o paciente		Bula para o profissional da saúde		Rotulagem	
radiofármacos	X	Contraindicado	510	518	511+512	520	514	
retinóides sistêmicos sujeitos a controle especial	X	Classificação conforme substância ativa	510		511+512		515	
retinóides tópicos sujeitos a controle especial	D	Classificação conforme substância ativa	503;508		509		513	

LISTA III: FRASES DE ALERTA

Número	Frase de alerta
1	Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, pois pode aumentar o risco de sangramentos.
2	Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
3	Não use este medicamento caso tenha asma ou úlcera no estômago.
4	Este medicamento não deve ser utilizado por pacientes que tenham asma ou úlcera estomacal.
5	Não use este medicamento em crianças ou adolescentes com sintomas gripais ou catapora. O uso de ácido acetilsalicílico pode causar a Síndrome de Reye, uma doença rara, mas grave.
6	O uso de ácido acetilsalicílico em crianças ou adolescentes pode causar a Síndrome de Reye, uma doença rara, mas grave. A Síndrome de Reye pode manifestar-se de 3 a 5 dias após o início ou durante a fase de recuperação de qualquer infecção viral, tendo sua frequência aumentada após exposição a medicamentos que contenham salicilatos.
7	Não use este medicamento em grandes áreas do corpo quando existirem feridas ou queimaduras, pois pode causar intoxicação e levar à morte.
8	Não aplique este medicamento em grandes áreas do corpo quando existirem lesões de qualquer tipo, feridas ou queimaduras, pois esse pode causar intoxicação, com possíveis alterações gastrintestinais, hipotermia, erupções cutâneas, insuficiência renal e morte.
9	Este medicamento deve ser usado apenas por adultos. O uso por crianças representa risco à saúde.
10	Produto de uso exclusivo por adultos. O uso por crianças representa risco à saúde.
11	O tratamento com este medicamento não deve se prolongar por mais de 7 dias, a menos que recomendado pelo médico, pois pode causar problemas nos rins, estômago, intestino, coração e vasos sanguíneos.
12	O tratamento com este medicamento não deve se prolongar por mais de 7 dias, devido ao aumento do risco de ocorrência de graves efeitos renais, cardiovasculares e gastrintestinais.
13	Este produto contém (indometacina, ibuprofeno, diclofenaco, ácido mefenâmico, cetoprofeno, naproxeno, flurbiprofeno, fenilbutazona, benzoato de sódio, amarelo de TARTRAZINA), que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais a asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.
14	A acitretina causa sérios danos ao feto e, por isso, sua utilização é proibida por mulheres grávidas. Mulheres com potencial de engravidar precisam utilizar métodos contraceptivos eficazes 30 dias antes do início do tratamento, durante o tratamento e três anos após seu término.
15	A acitretina é um composto altamente teratogênico a sua utilização é proibida por mulheres grávidas. Mulheres com potencial de engravidar precisam utilizar métodos contraceptivos eficazes 30 dias antes do início do tratamento, durante o tratamento e três anos após seu término.
16	As mulheres que utilizam este medicamento não devem consumir bebidas alcoólicas durante o tratamento e até dois meses após seu término, pois o álcool ajuda a formar uma substância chamada etretinato que, em caso de ocorrência de gravidez, pode causar sérios danos ao feto.

17	Oriente as pacientes mulheres a não consumirem bebidas alcoólicas durante o tratamento com acitretina e até dois meses após seu término, pois o uso concomitante de álcool potencializa a formação de etretinato, agente altamente teratogênico.
18	A doação de sangue é contraindicada durante o tratamento com _____ (informar a substância) e até _____ (informar o tempo em meses ou anos) após o seu término, devido ao dano que ele pode causar à pessoa que receber o sangue.
19	Informe a seu paciente que a doação de sangue é absolutamente contraindicada durante o tratamento com _____ (informar a substância) e até _____ (informar o tempo em meses ou anos) após seu término, devido ao dano que ele pode causar ao receptor.
20	Este medicamento contém álcool benzílico, que pode ser tóxico, principalmente para recém-nascidos e crianças de até 3 anos.
21	Informe a seu paciente que este medicamento contém álcool benzílico, podendo ser tóxico, principalmente para neonatos e crianças de até 3 anos.
22	Este medicamento contém álcool benzílico.
23	Este medicamento contém alumínio, que pode ser tóxico, especialmente para bebês prematuros.
24	Pesquisas indicam que pacientes com função renal prejudicada, incluindo neonatos prematuros, que recebam níveis parenterais de alumínio em quantidades maiores que 4 ou 5 µg/kg/dia acumulam alumínio em níveis associados com toxicidade do sistema nervoso central e toxicidade óssea. O acúmulo dessa substância nos tecidos pode ocorrer até mesmo em menores doses de administração.
25	Não utilize este medicamento em crianças, pois pode ocorrer intoxicação, inclusive com convulsões.
26	Há evidências que associam o uso pediátrico de cânfora à ocorrência de intoxicação, inclusive com convulsões. Este medicamento não deve ser utilizado por crianças, principalmente as pequenas ou mal nutridas, pois nesses casos a absorção pela pele pode ser substancial. Além disso, crianças possuem mecanismos de desintoxicação hepática imaturos.
27	O tratamento com este medicamento não deve ser prolongar por mais de 5 dias, pois pode causar problemas nos rins, estômago, intestino, coração e vasos sanguíneos.
28	O tratamento com este medicamento não deve ser prolongar por mais de 3 dias, devido ao aumento do risco de ocorrência de graves efeitos renais, cardiovasculares e gastrintestinais.
29	Procure imediatamente o médico se você perceber alguma alteração na sua saúde, pois este medicamento pode causar graves problemas no coração e no sangue, além de convulsões.
30	Mortalidade aumentada de paciente idosos com psicose relacionada à demência e casos graves ou fatais de agranulocitose, convulsões, miocardite e outros eventos cardiovasculares e respiratórios foram observados com o uso de clozapina. Siga rigorosamente as orientações da bula para reduzir a chance de ocorrência de eventos adversos.
31	Atenção: Este medicamento contém o(s) corante(s) _____ (informar o(s) corante(s) de acordo com a DCB) que pode(m), eventualmente, causar reações alérgicas.
32	Este medicamento deve ser aplicado somente no glúteo. Não deve ser injetado no braço.
33	Atenção: Aplicar exclusivamente no glúteo. Não injetar no braço.
34	Este medicamento contém _____ % de álcool (etanol) e pode causar intoxicação, especialmente em crianças
35	Contém _____ % de álcool (etanol).
36	Não doe sangue se você utiliza este medicamento, mesmo após o término do tratamento, devido ao dano que ele pode causar à pessoa que receber o sangue.
37	Informe a seu paciente que o uso deste medicamento causa inaptidão definitiva para doação de sangue, devido ao dano que ele pode causar ao receptor.
38	Atenção fenilcetonúricos: contém fenilalanina.
39	Atenção: não use mais do que o recomendado na bula, pois o excesso deste medicamento pode causar graves problemas nos rins.
40	Oriente seu paciente quanto à quantidade do medicamento que deve ser utilizada, pois o uso acima do recomendado na bula pode causar nefropatia aguda e insuficiência renal.
41	Oriente seu paciente sobre a quantidade do medicamento que deve ser utilizada, pois o uso acima das doses recomendadas por dia pode causar desequilíbrio hidroeletrólítico.
42	Atenção diabéticos: contém açúcar (_____ mg de _____ (tipo de açúcar)/unidade farmacotécnica ou unidade de medida).
43	Diabêtes. Este medicamento contém açúcar (_____ mg de _____ (tipo de açúcar)/unidade farmacotécnica ou unidade de medida), portanto, deve ser usado com cautela por portadores de Diabêtes.
44	Atenção, diabéticos: contém açúcar.
45	Atenção, portadores de Doença Celíaca ou Síndrome Celíaca: contém glúten.
46	Atenção ao prescrever este medicamento a portadores de Doença Celíaca ou Síndrome Celíaca, pois contém glúten.
47	Este medicamento pode causar danos ao fígado. Por isso, seu uso requer acompanhamento médico estrito e exames laboratoriais periódicos para controle. É contraindicado para pessoas que tenham doença no fígado.
48	Este medicamento pode causar hepatotoxicidade. Por isso, requer uso cuidadoso, sob vigilância médica estrita e acompanhado por controles periódicos da função hepática _____ (colocar a frequência da monitorização). É contraindicado para pessoas que tenham insuficiência hepática ou fatores predisponentes.
49	Este medicamento pode causar depressão, psicose, idéias suicidas, tentativas de suicídio e suicídio. Portanto, informe ao seu médico se você começar a se sentir deprimido, irritado ou angustiado.
50	Este medicamento pode causar depressão, psicose, idéias suicidas, tentativas de suicídio e suicídio. O médico deverá avaliar o risco/benefício da continuação do tratamento.
51	Não use mais do que 4000mg de paracetamol por dia (número total de unidades farmacotécnicas ou unidades de medidas/dia). O uso acima desse limite pode ocasionar graves danos à saúde, sendo o principal risco a perda de função do fígado.
52	Não é recomendado o consumo de bebidas alcoólicas durante o uso deste medicamento, pois aumenta o risco de dano ao fígado.
53	Oriente o seu paciente a não ultrapassar o limite de 4000mg de paracetamol por dia e a não consumir álcool durante o uso deste medicamento, pois ele aumenta o risco de dano hepático.
54	Atenção: Se você estiver utilizando outro(s) medicamento(s) que contenha(m) paracetamol, observe se você está ultrapassando o limite diário de 4000mg. Se você consumiu acima desse limite, interrompa o uso e procure o médico imediatamente. Os sintomas de dano ao fígado podem surgir somente após alguns dias de consumo de paracetamol além do limite.
55	Ao prescrever este medicamento, verifique se o paciente já está usando outro medicamento que contenha paracetamol, para evitar que o limite diário de 4000mg seja ultrapassado.
56	Não use mais de 4000mg por dia. Não consuma bebidas alcoólicas.
57	Este medicamento contém _____ mg de potássio/(inserir a unidade farmacotécnica ou unidade de medida). Se você faz dieta de restrição de potássio, tem problemas renais ou toma medicamentos para controle da pressão arterial ou para o coração, consulte o médico antes de usar este medicamento.
58	Este medicamento contém _____ mg de potássio/(inserir a unidade farmacotécnica ou unidade de medida), o que deve ser considerado quando utilizado por pacientes em dieta de restrição de potássio, com função renal reduzida ou que estejam utilizando medicamentos para controle de hipertensão arterial ou para o coração.
59	Este medicamento contém _____ mg de sódio/(inserir a unidade farmacotécnica ou unidade de medida). Se você faz dieta de restrição de sal (sódio) ou toma medicamento para controlar a pressão arterial, consulte o médico antes de usar este medicamento.
60	Este medicamento contém _____ mg de sódio/(inserir a unidade farmacotécnica ou unidade de medida), o que deve ser considerado quando utilizado por pacientes hipertensos ou em dieta de restrição de sódio.
61	Atenção pacientes alérgicos ou asmáticos: este medicamento contém _____ (inserir o nome do sulfito, por ex. metabisulfito de sódio), uma substância que pode causar reações alérgicas graves, principalmente em pacientes asmáticos.
62	Este medicamento contém _____ (inserir o nome do sulfito, por ex. metabisulfito de sódio), um sulfito que pode causar reações alérgicas, inclusive sintomas anafiláticos e episódios asmáticos menos severos ou com risco de morte em pessoas susceptíveis. A prevalência da sensibilidade aos sulfitos na população em geral é desconhecida e provavelmente baixa. A sensibilidade aos sulfitos ocorre mais frequentemente em pacientes asmáticos do que em não asmáticos.
63	Atenção, pacientes alérgicos ou asmáticos: leiam com cuidado os alertas na bula.
64	Você não deve dirigir veículos ou operar máquinas _____ (informar se durante todo o tratamento, no início do tratamento, ao aumentar a dose, em tratamento prolongado, ou outra situação), pois sua habilidade e capacidade de reação podem estar prejudicadas.
65	Oriente seu paciente a não dirigir veículos ou operar máquinas _____ (informar se durante todo o tratamento, no início do tratamento, ao aumentar a dose, em tratamento prolongado, ou outra situação), pois sua habilidade e capacidade de reação podem estar prejudicadas.
66	O uso deste medicamento pode causar tontura, desmaios ou perda da consciência, expondo o paciente a quedas ou acidentes.
67	Este medicamento pode aumentar o risco de sangramento em caso de dengue.
68	Em caso de suspeita de dengue, a prescrição deste medicamento ou a manutenção do tratamento com ele deve ser reavaliada, devido a seu potencial hemorrágico.
69	A doação de sangue é contraindicada durante o tratamento com _____ (informar a substância), devido ao dano que ele pode causar à pessoa que receber o sangue.
70	Informe a seu paciente que a doação de sangue é absolutamente contraindicada durante o tratamento com _____ (informar a substância) devido ao dano que esse medicamento pode causar ao receptor.
71	É importante utilizar este medicamento durante todo o tempo prescrito pelo médico, mesmo que os sinais e sintomas da infecção tenham desaparecido, pois isso não significa a cura. A interrupção do tratamento pode contribuir para o aparecimento de infecções mais graves.
72	Para prevenir o desenvolvimento de bactérias resistentes, este medicamento deverá ser usado somente para o tratamento ou prevenção de infecções causadas ou fortemente suspeitas de serem causadas por microorganismos sensíveis a este medicamento.
73	Atenção: o uso incorreto deste medicamento pode causar resistência microbiana e falha no tratamento.
74	Este medicamento não protege contra as doenças transmitidas por relações sexuais, inclusive a AIDS. Para essa proteção é recomendado que você ou seu parceiro use preservativo (camisinha) em cada relação sexual.
75	Informe ao paciente que este medicamento não protege contra doenças sexualmente transmissíveis, recomendando o uso de preservativo sempre que for necessário.
76	O fumo aumenta o risco de este medicamento causar graves problemas no coração e vasos sanguíneos. Informe ao seu médico se você é fumante.
77	O uso deste medicamento deve ser evitado por mulheres acima de 35 anos que fumam mais de 15 cigarros por dia, pois o risco de graves efeitos cardiovasculares é acentuado.
78	Se você já teve trombose, não use este medicamento.
79	Não prescreva este medicamento para mulheres com histórico de tromboembolismo venoso associado à gravidez ou ao uso de estrogênios exógenos, ou mesmo de causa desconhecida, a menos que estejam usando anticoagulantes.
80	O uso deste medicamento pode causar tontura. Evite dirigir veículos e/ou operar máquinas, principalmente _____ (informar se durante todo o tratamento, no início do tratamento, ao aumentar a dose, em tratamento prolongado, ou outra situação).
81	Informe ao seu paciente que o uso deste medicamento pode causar tontura e que, por isso, ele deve evitar dirigir veículos e/ou operar máquinas, principalmente _____ (informar se durante todo o tratamento, no início do tratamento, ao aumentar a dose, em tratamento prolongado, ou outra situação).
82	Atenção: este medicamento pode causar dependência física ou psíquica
83	Este medicamento pode aumentar o risco de infecções. Informe ao seu médico qualquer alteração no seu estado de saúde.
84	Medicamentos imunossupressores podem ativar focos primários de tuberculose. Esteja alerta quanto à possibilidade de surgimento de doença ativa, tomando os cuidados para o diagnóstico precoce e tratamento.
85	Algumas vacinas são contraindicadas para quem está tomando imunossupressor. Antes de tomar qualquer vacina, informe ao profissional de saúde que você está tomando medicamento imunossupressor.
86	Informe a seu paciente que, durante tratamento, o uso de vacinas exige avaliação do profissional de saúde.
87	Este medicamento não deve ser usado para redução de peso, pois pode causar problemas graves de saúde ou até mesmo morte quando usado em doses maiores.
88	Hormônios da tireóide não devem ser usados para a redução de peso. Em pacientes eutireoidianos, as dosagens normais não são eficazes para a perda de peso e dosagens maiores podem produzir manifestações de toxicidade graves ou mesmo fatais, particularmente quando administradas em associação com aminas simpatomiméticas.
89	Enquanto estiver fazendo tratamento com este medicamento, você não deve utilizar medicamentos para impotência sexual, como a sildenafil, tadalafila, vardenafila ou lodenafila, pois podem provocar uma grave diminuição da pressão arterial com risco de morte.
90	Informe ao paciente que este medicamento pode causar hipotensão grave com alto risco de morte quando associado aos inibidores de fosfodiesterase-5, como a sildenafil, a tadalafila, a vardenafila ou a lodenafila.
91	Atenção: este medicamento pode causar hipertensão pulmonar (doença que afeta o pulmão e o coração).
92	Este medicamento pode causar dependência física e psíquica com o uso prolongado.
93	Este medicamento contém narcótico capaz de causar dependência física e psíquica com o uso prolongado.
94	Informe ao seu médico se você tomou ou está tomando medicamentos imunossupressores, pois esses medicamentos podem alterar o efeito da vacina.
95	A resposta imunológica à vacina pode ser alterada se o paciente estiver sob tratamento imunossupressor.

96	Esta vacina possui _____ (<i>nome do composto mercurial</i>) e pode causar reações alérgicas.
97	Não use este medicamento caso tenha úlcera no estômago.
98	Este medicamento não deve ser utilizado por pacientes que tenham úlcera estomacal.
501	Caso você esteja grávida, somente utilize medicamentos com o conhecimento do seu médico ou cirurgião-dentista, pois alguns medicamentos podem causar problemas ao feto.
502	Este medicamento pode ser prescrito durante a gravidez. Não há evidências de risco, sendo remota a possibilidade de dano fetal.
503	Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou cirurgião-dentista.
504	Uso _____ (<i>no X trimestre ou na XX semana de gestação ou durante a gestação</i>): Os estudos em animais não demonstraram risco fetal, mas não há estudos controlados em mulheres grávidas. A prescrição deste medicamento depende da avaliação do risco/benefício para a paciente.
505	Uso _____ (<i>no X trimestre ou na XX semana de gestação ou durante a gestação</i>): Os estudos em animais revelaram riscos, mas que não foram confirmados em estudos controlados em mulheres grávidas. A prescrição deste medicamento depende da avaliação do risco/benefício para a paciente.
506	Uso _____ (<i>no X trimestre ou na XX semana de gestação ou durante a gestação</i>): Não foram realizados estudos em animais nem em mulheres grávidas sobre o uso deste medicamento. A prescrição deste medicamento depende da avaliação do risco/benefício para o paciente.
507	Uso _____ (<i>no X trimestre ou na XX semana de gestação ou durante a gestação</i>): Os estudos em animais revelaram risco, mas não existem estudos disponíveis realizados em mulheres grávidas. A prescrição deste medicamento depende da avaliação do risco/benefício para a paciente.
508	Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.
509	Uso _____ (<i>no X trimestre ou na XX semana de gestação ou durante a gestação</i>): Este medicamento demonstrou evidências positivas de risco fetal humano. A prescrição deste medicamento depende da avaliação do risco/benefício para a paciente.
510	Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas (<i>no X trimestre ou na XX semana de gestação ou durante toda a gestação ou por mulheres que possam ficar grávidas</i>). Ele provoca graves problemas ao feto, sendo o risco ao feto maior do que qualquer benefício possível para a paciente.
511	Este medicamento não deve ser prescrito para mulheres grávidas (<i>no X trimestre ou na XX semana de gestação ou durante toda a gestação ou por mulheres que possam ficar grávidas</i>). Ele provoca anomalias fetais, sendo o risco ao feto maior do que qualquer benefício possível para a paciente.
512	A prescrição deste medicamento para mulheres com potencial de engravidar deve ser acompanhada por métodos contraceptivos adequados, com orientação quanto aos riscos de seu uso e rigoroso acompanhamento médico.
513	Atenção: não use este medicamento se você estiver grávida. Ele pode causar problemas ao feto.
514	Atenção: não use este medicamento se você estiver grávida. Ele causa graves problemas ao feto.
515	Atenção: não use este medicamento se você estiver grávida. Ele causa graves defeitos na face, nas orelhas, no coração e no sistema nervoso do feto.
516	Durante o período de aleitamento materno ou doação de leite humano, só utilize medicamentos com o conhecimento do seu médico ou cirurgião-dentista, pois alguns medicamentos podem ser excretados no leite humano, causando reações indesejáveis no bebê.
517	Este medicamento inibe a produção de leite humano. Seu médico deve apresentar alternativas para o seu tratamento ou para a alimentação do bebê.
518	Este medicamento é contraindicado durante o aleitamento, pois é excretado no leite humano e pode causar reações indesejáveis no bebê. Seu médico ou cirurgião-dentista deve apresentar alternativas para o seu tratamento ou para a alimentação do bebê.
519	O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação do risco/benefício. Quando utilizado, pode ser necessária monitorização clínica e/ou laboratorial do lactente (<i>citar as reações a serem observadas e os parâmetros a serem avaliados</i>).
520	O uso deste medicamento no período da lactação é contraindicado pelo risco de reações adversas ao lactente. Caso não exista outra alternativa de tratamento, o aleitamento materno ou a doação de leite humano deverão ser interrompidos.